

# 야생 독버섯



- > 위험한 야생 버섯들은 보통 첫 가을 비가 충분히 내린 후 나타납니다.
  - > 이 버섯들은 부쉬랜드, 숲, 공원, 놀이터, 학교 풋볼 경기장, 농장 방목장은 물론 집과 가까운 곳에선 여러분의 정원의 잔디, 퇴비, 뿌리 덮개 또는 짚을 포함한 많은 장소에서 발견할 수 있습니다.
  - > 야외에 계실 때는 아이들과 반려동물을 가까이서 잘 지켜보아야 합니다. 왜냐하면 버섯들은 쉽게 닿을 수 있고 먹음직스러워 보일 수 있습니다.
  - > 해외에서 살았던 분들은 호주의 독버섯은 다른 나라의 식용 버섯과 비슷하게 생겼다는 사실을 알고 계셔야 합니다.
  - > 데스크랩 버섯은 가장 위험하며 치명적인 간손상을 일으킬 수 있습니다. 조리하거나 껍질을 제거한다고 해서 독이 제거되는 것이 아닙니다. 데스크랩은 참나무, 개암나무, 밤나무에서 자라지만 치명적인 버섯들은 모든 장소에서 자랄 수 있습니다. 식용으로 안전한 유일한 버섯은 믿을 만한 식료품가게 또는 슈퍼마켓에서 구입하는 버섯입니다.
  - > 우연히 야생 버섯을 먹었다면 증세가 생길 때까지 기다리지 마시고 독 정보 센터 **13 1126 (Poisons Information Centre)** 번으로 연락하시고 그곳의 조언을 따르세요.
- 야생 버섯을 먹고 몸이 아픈 사람은 누구나 긴급 의료 처치를 구해야 합니다.
- 응급상황에는 항상 트리플 제로(000)로 연락하세요.

## 야생 독버섯 중독의 증상은 다음을 포함합니다:

- > 심한 위 경련
- > 복부 통증
- > 구토
- > 메스꺼움
- > 설사

증상은 버섯을 먹은 후 3-6시간 이후부터 나타나기 시작하며 3일 동안도 지속될 수 있습니다.

가장 위험한 종류의 독버섯들은 섭취 후 24시간 이후부터 지연된 증상이 나타날 수 있습니다.

[www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning](http://www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning)

