

ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੂਚਨਾ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰੀਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਇਰਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਆਇਰਨ (ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੱਤ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਹੀਮਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਬਨਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਮਗਲੋਬਿਨ ਰੈਂਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲ (ਰਕਤਾਣੂ) ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੱਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਰਨ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਮਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀਮਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਡੈਫਿਸ਼ੈਂਸੀ ਅਨੀਮੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰਲ ਆਇਰਨ (iron liquid) ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖੁਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਆਇਰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ ਮੁਸਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰਲ ਆਇਰਨ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਇਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰਲ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹਨ?

ਨਹੀਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰਲ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੌਨੀਕ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਆਮ (ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ?

- > ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੋ।
- > ਗੋਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾਓ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋਡੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਥਾਓ।
- > ਆਇਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ (ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ), ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਚੁਸ਼ (ਫਲ ਦਾ ਰਸ) ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਜਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਈ-ਏਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ - ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।
- > ਆਪਣੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਤਰਲ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਕੌਢੀ, ਢੱਧ, ਚਾਕਲੇਟ, ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਵਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ, ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜਜਬ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- > ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰਲ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
 - ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਐਟੈਂਸਿਡ (ਖੱਟਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ) (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Mylanta ਜਾਂ Gaviscon); (ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਇਆਂ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿਨਸਨਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ; ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਵਾਖਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ

- > ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਭ ਦਵਾਇਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਾਲਾ-ਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- > ਆਇਰਨ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਹਰੀਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ।
- > ਇਕ ਬਾਲਗ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਓ।
- > ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਚਣਚੇਤ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਇਜ਼ਨਸ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 131126 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।



ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੂਚਨਾ (ਜਾਗੀ)

ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਕੀ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਹਰ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰਲ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- > ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ ਲਗ ਜਾਣਾ। ਭੁਗਾਕ ਵਿਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਵਾਖਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਵੇ।
 - > ਪੇਟ ਦੀ ਗੜਬੜੀ, ਉਲਟੀ ਆਣਾ (ਬੀਮਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ) ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਪੀੜ (ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਕੁੜਨਾ)। ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਇਰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ (ਜਿਦਾਂ ਕਿ 1 ਗੋਲੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ) ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੁਗਾਕ ਰੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ (ਜਿਦਾਂ ਕਿ ਤਰਲ ਆਇਰਨ) ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁਗਾਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 - > ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਾਨੇ (ਟੱਟੀ) ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰਲ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਕਿ ਆਇਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਡੀ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਡ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਵਾਖਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਉਂਟਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਉਂਟਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਇਆਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਇਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰਲ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪਖਾਨੇ ਵਿਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਬਚਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ
- ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਕ ਕੋਰਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦਵਾਇਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਏਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਣੀਆਂ ਪੈਣ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)। ਜੇ ਇਹ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈਣਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਰੀ ਆਇਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ / ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ.....

ਜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

Ferro-tab, Ferro-f-tab, FGF, Fefol, Ferrogradumet, Ferrograd C, Maltofer.

ਭੁਗਾਕ / ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ:.....

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦੀ ਤਰੀਖ:..... ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਰੀਖ.....

ਵਾਧੂ ਨੋਟ:.....

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ:

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਮਿਡਵਾਈਫਰ ਜਾਂ ਦਵਾਖਾਨਾ

ਅਧਿਕਾਰੀ (pharmacist) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਪਾਉ:

www.sahealth.sa.gov.au/bloodorgantissue