

ផ្សិតព្រៃដ៏គ្រោះថ្នាក់



- > ផ្សិតព្រៃដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាធម្មតាលេចឡើង បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ភ្លៀងដ៏ល្អលើកដំបូងនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ។
- > គេអាចរកឃើញវានៅកន្លែងជាច្រើន រួមទាំងដីមានព្រៃស៊ុបទ្រុប ព្រៃឈើ សួនសាធារណៈ សួនកុមារ ទីវាលសាលា វាលស្រែចំការ ហើយនៅក្បែរផ្ទះនៅក្នុងសួនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ជីកំប៉ុស កំទេចឈើ ឬចំបើង។
- > សូមយូរមើលកូនៗ និងសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកនៅខាងក្រៅ ពីព្រោះវាងាយស្រួលនឹងទៅក្បែរផ្សិត ហើយមើលទៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីបរិភោគ។
- > អ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅបរទេសគួរតែដឹងថា ផ្សិតពុលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី អាចមើលទៅដូចផ្សិតដែលអាចបរិភោគបាន ដែលគេរកឃើញមានក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត។
- > ផ្សិត Death cap mushrooms (ផ្សិតមានម្នាក់ដែលពុលដល់ស្លាប់) មានគ្រោះថ្នាក់បំផុត ហើយអាចបណ្តាលឱ្យខូច ម្ហូបឆ្ងល់ឆ្ងាញ់។ ការចម្អិន ឬយកសំបកចេញ មិនយកជាតិពុលចេញទេ។ ផ្សិត Death cap ដុះជាមួយដើមឈើ oak, ដើមឈើ hazel និងដើម chestnut ប៉ុន្តែផ្សិតដ៏សាហាវអាចដុះនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ ផ្សិតតែមួយគត់ដែលមានសុវត្ថិភាព ក្នុងការបរិភោគ គឺជាផ្សិតដែលអ្នកទិញពីហាងលក់គ្រឿងទេស ឬផ្សារទំនើបដែលអាចទុកចិត្តបានប៉ុណ្ណោះ។
- > ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់បរិភោគផ្សិតព្រៃដោយចៃដន្យ កុំរង់ចាំឱ្យរោគសញ្ញាចាប់ផ្តើម សូមទូរសព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ ព័ត៌មានអំពីជាតិពុល តាមលេខ 13 11 26 ហើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពួកគេ។ អ្នកណាដែលឈឺបន្ទាប់ពីបរិភោគផ្សិតព្រៃ គួរតែស្វែងរកការព្យាបាលជាបន្ទាន់។

នៅពេលមានអាសន្ន សូមទូរសព្ទទៅលេខសុន្យបីដង (000)។

រោគសញ្ញានៃការពុលផ្សិតព្រៃរួមមាន៖

- > ឈឺពោះរមួលយ៉ាងខ្លាំង
- > ឈឺពោះ
- > ក្អួត
- > ចង្កោរ
- > រាគ

រោគសញ្ញាជាធម្មតាចាប់ផ្តើមពី 3 ទៅ 6 ម៉ោង បន្ទាប់ពីបរិភោគផ្សិត ហើយអាចបន្តរហូតដល់ទៅ 3 ថ្ងៃ។ ផ្សិតដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត អាចមានរោគសញ្ញាពន្យារដែលអាចចាប់ផ្តើម រហូតដល់ទៅ 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីបរិភោគ។

www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning

