

GIFTIGE WILDE PADDENSTOELEN



- > Gevaarlijke wilde paddenstoelen verschijnen meestal na de eerste goede herfstregens.
 - > Je vindt ze op veel plaatsen, waaronder bosgebieden, wouden, openbare parken, speeltuinen, schoolpleinen, weilanden en dichterbij huis in uw eigen tuin in het gras, compost, mulch of stro.
 - > Het is belangrijk om goed op kinderen en huisdieren te letten als je buiten bent, want paddenstoelen zijn gemakkelijk te vinden en zien er eetbaar uit.
 - > Mensen die in het buitenland hebben gewoond moeten zich bewust zijn dat giftige paddenstoelen in Australië erg kunnen lijken op eetbare paddenstoelen in andere landen.
 - > Groene knolzwammen zijn het gevaarlijkst en kunnen fatale leverschade veroorzaken. Koken of schillen verwijdert het gif niet. De knolzwam groeit bij eikenbomen, hazelaren en kastanjabomen, maar dodelijke paddenstoelen kunnen overal groeien. De enige veilig eetbare paddenstoelen zijn degenen die je bij een betrouwbare groenteboer of supermarkt kunt kopen.
 - > Als iemand per ongeluk een wilde paddenstoel eet, wacht dan niet op symptomen om het **Poisons Information Centre (Vergiftigingen informatiecentrum)** te bellen op **13 11 26** en hun advies op te volgen.
- Als iemand na het eten van een wilde paddenstoel ziek wordt, moeten ze dringend medische hulp zoeken.

Bel in een noodgeval altijd triple zero (000).

Symptomen van vergiftiging door wilde paddenstoelen zijn o.a.:

- > Hevige maagkrampen
- > Buikpijn
- > Braken
- > Misselijkheid
- > Diarree

De symptomen beginnen meestal 3 tot 6 uur na het eten van een paddenstoel en kunnen tot 3 dagen duren.

De gevaarlijkste paddenstoelen kunnen uitgestelde symptomen hebben die tot 24 uur na het eten kunnen beginnen.

www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning

