

FUNGHI SELVATICI VELENOSI



- > I funghi selvatici pericolosi compaiono solitamente dopo le prime piogge autunnali.
- > Si possono trovare in molti luoghi, tra cui il bosco (bushland), le foreste, i parchi pubblici, i parchi giochi, i campi scolastici, i campi agricoli e nelle tue vicinanze, proprio a casa nel tuo giardino, sul prato, nel terriciato (compost), nella pacciame o la paglia.
- > Tieni d'occhio i tuoi bambini e gli animali domestici quando sei fuori perché i funghi sono facilmente individuati e possono sembrare interessanti da mangiare.
- > Le persone che hanno vissuto all'estero dovrebbero sapere che i funghi velenosi in Australia possono sembrare funghi commestibili trovati in altri paesi.
- > I funghi Tignosa Verdognola (Death Cap) sono i più pericolosi e possono causare danni mortali al fegato. Cucinare o togliere la buccia non rimuove il veleno. Il tignosa verdognola (death cap) cresce con le querce, i noccioli e i castagni, ma i funghi letali possono crescere ovunque. Gli unici funghi sicuri da mangiare sono quelli che compri da un fruttivendolo o supermercato affidabile.
- > Se qualcuno mangia accidentalmente un fungo selvatico, non aspettare che i sintomi inizino, chiama il **Centro informazioni sui Veleni al 13 11 26 (Poisons Information Centre)** e segui i loro consigli.

Chiunque si ammali dopo aver mangiato un fungo selvatico dovrebbe consultare urgentemente un medico.

In caso di emergenza, chiama sempre il triplo zero (000).

I sintomi di avvelenamento da funghi selvatici includono:

- > **Crampi violenti allo stomaco**
- > **Dolore addominale**
- > **Vomito**
- > **Nausea**
- > **Diarrea**

I sintomi di solito iniziano 3-6 ore dopo aver ingerito un fungo e possono durare fino a 3 giorni.

I funghi più pericolosi possono presentare sintomi ritardati che possono manifestarsi fino a 24 ore dopo averli ingeriti.

www.sahealth.sa.gov.au/mushroompoisoning

